

FICHA TÉCNICA

USO EN SALUD PÚBLICA
PROHIBIDA SU VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL



Insecticida organofosforado larvicida
granulado

REG. RSCO-USP-22-2015

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Temefos:

0,0,0'0' - tetrametil 0,0-tiodi-p-fenileno
bis(fosforotioato)

(Equivalente: Contiene 10 g de i.a. / kg)

No menos de.....1.00%

INGREDIENTES INERTES:

Vehículo, portador, solvente y
emulsificante.

No más de.....99.00%

TOTAL.....100.00%

P/P

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE
INGESTIÓN, POR EL CONTACTO
CON LA PIEL, O SI SE INHALA**

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
SALUD”

PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use guantes si desea una medida adicional de seguridad cuando maneje el producto, aunque no son necesarios ya que los sobres impiden el contacto de la piel con el producto. Manténgase preferentemente limpias y ventiladas las áreas de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando éste utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“No almacenar en casas habitación”.

“No destape las boquillas con la boca”.

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.

“No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evitese contacto con los ojos”.

INSTRUCCIONES DE USO

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

La dosis de aplicación de **ALABASTER 1 GR** va a depender del tipo de agua a tratar. **ALABASTER 1 GR** controla las larvas de mosquitos de *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Anopheles spp.* y *Culex spp.*

Este producto está autorizado para su uso en áreas de tratamiento de aguas residuales en hospitales, industria alimentaria y cualquier área donde se lleve a cabo esta actividad.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Aplique la cantidad de sobres de **ALABASTER 1 GR** como lo indica el cuadro de dosis. No abra los empaques de los sobres de **ALABASTER 1 GR** con la boca, haga uso de guantes y tijeras. Deje caer el producto en el agua del área que se desea tratar o donde se requiera. Para que comience su acción es necesario que exista agua. Aplique los sobres requeridos y repita según sea necesario. Puede aplicarse en tratamiento

localizado a criaderos de larvas de mosquitos y en áreas similares.

TIEMPO DE REENTRADA: El periodo de reingreso al área tratada puede ser inmediata.

CONTRAINDICACIONES: No deberá aplicarse en agua con crustáceos jóvenes y peces de ornato. Evitar aplicaciones en depósitos de agua como para consumo humano.

Utilice ALABASTER 1 GR GR de la siguiente manera:

TIPO DE AGUA	DOSIFICACIÓN
LIMPIA (agua estancada, lagunas superficiales, lagos y charcos)	20 g / 200 L (1 sobre)
MODERADAMENTE CONTAMINADA (agua con marea, pantanos, ciénegas y aguas con contenido de materia orgánica)	
ALTAMENTE CONTAMINADA (drenaje, tubos de desagüe, aguas muy contaminadas)	20 – 40g / 200 L (1 a 2 sobres)

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos y/o piel enjuague bien con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, (también utilizar jabón para la piel). Si se ha ingerido y la persona está consciente no provoque le vómito, enjuague la boca y administre 2 vasos con agua y carbón activado. De inmediato busque atención médica. Si el paciente está inconsciente no induzca el vómito ni administre nada por vía oral. Consulte al médico inmediatamente. En caso de intoxicación llamar a ATOX. Tel. (01 800) 000 28 69

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Organofosforados.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, dolor abdominal y temblor de lengua y párpados. Severos: Diarrea profusa, dificultad respiratoria, micción y defecación involuntarias, convulsiones y cianosis.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina, repita la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar 2 a 5 mg de sulfato de atropina vía I.V. lentamente cada 5 a 15 minutos hasta

completar atropinización. No administrar morfina ni barbitúricos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para algas y peces, EXTREMADAMENTE tóxico para invertebrados acuáticos y plantas vasculares y ALTAMENTE tóxico para abejas.

TITULAR DE REGISTRO:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, México D.F. Tel. 52 784 680

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

CODEQUIM, S.A. DE C.V.

Av. Revolución #639 piso 7, Col. San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, C.P. 03800, México D.F. Tel. 2614 1533

HECHO EN MÉXICO

18.01.16 TR